



Pequeña guía zanahoria

Consortium PRISME

291 rue de la Coopérative,
Sherrington

Tél : 450 454-3992

Télécopieur : 450 454-5216

Courriel : info@prisme.ca

www.prisme.ca





Nota al utilizador :

Versión 2021

Como toda herramienta de referencia, ella está en constante evolución. A pesar de toda la atención prestada en la redacción de esta guía, los errores pudieron filtrarse. Nosotros nos despojamos de toda responsabilidad ligada al uso de las informaciones de esta guía.

Al menos que se demuestre lo contrario, todas las fotos de esta guía fueron tomadas por los empleados del Consorcio PRISME como parte de sus funciones.

Crédito fotográfico de la portada : Cédric Simard

Traducción del francés prestada por Alejandro Polanco, PRISME

INDICE

PLAGAS	4
INSECTOS	4
Gusano gris	4
Mosca de la zanahoria, <i>Psila rosae</i>	5
Picudo/gorgojo de la zanahoria, <i>Listronotus oregonensis</i>	6
Nematodos de nódulos de las raíces, <i>Meloidogyne hapla</i>	8
ENFERMEDADES Y DESORDENES FISIOLÓGICOS	9
Lesión horizontal, <i>Pythium spp</i>	9
Quemazón cercosporéana de la zanahoria, <i>Cercospora carotae</i>	10
Quemazón alternaria de la zanahoria, <i>Alternaria dauci</i>	11
UNIDAD DE MONITOREO	12
ESTADO FENOLOGICO	13
TECNICAS DE MONITOREO	14
Gusano gris	14
Mosca de la zanahoria	15
Picudo de la zanahoria	16
Quemazón cercosporéana	17
Nematodos de nódulos	18
Calidad de las zanahorias	19
REPORTES DE MONITOREO	20
HISTORICO	22
TIPOS Y CODIGOS DE DISTRIBUCION	23
LISTA DE CODIGOS	24

PLAGAS

INSECTOS

Gusano gris



Descripción:

- Lisos, rayas longitudinales o manchas oscuras
- Tamaño: 10 a 40 mm
- Color: marrón, gris, rojo o negro

Periodo de aparición: a partir del momento donde las noches son superiores a 10°C

Distribución: varias plantas atacadas en una misma hilera, por focos

Localización:

- En los bordes de bosques, canales, praderas o pastos, al nivel de las hojas
- De día se esconden bajo la superficie del suelo (2 a 8 cm de profundidad)

Daños causados:

- Planta o follaje cortado a nivel de suelo



ENFERMEDADES & DESORDENES FISIOLOGICOS

Lesión horizontal, *Pythium spp.*

También llamada “cavidad pitiana “

Daños causados:

- Presencia de una cavidad donde la abertura es más pequeña que la cavidad misma
- Profundidad de la cavidad: alrededor 0,5 mm
- Generalmente en la parte superior de la zanahoria
- Pequeñas cavidades en forma de óvalos; lesiones mas grandes tienen una forma irregular con un borde mal definido

Periodo de aparición:

Toda la temporada, afecta todos los estados de desarrollo

Distribución:

- Zonas con demasiada agua
- Campos o porción de campos con pH inadecuado o bajo en fertilización
- Campos históricamente afectados

